

ZOOLOGÍA. *Contribuciones a la ornitología de Chile, por el doctor R. A. Philippi i Luis Landbeck.—Comunicacion de los mismos a la Facultad de Ciencias Físicas en 1864.*

Pteroptochus castaneus.

Carácter distintivo de la especie. La cara, los lados de la cabeza, encima i debajo de los ojos, la barba, la garganta i el pecho son un castaño uniforme.

	Pulg.	lín.
Longitud total.....	9	6
.. del pico.....	..	10
Altura del pico.....	..	4
Anchura del mismo.....	..	4
Longitud de la cola.....	3	..
.. de la ala desde su dobladura.....	3	7
.. del tarso.....	1	7
.. del dedo exterior sin la uña.....	..	11
.. de su uña.....	..	7
.. del dedo mediano sin la uña.....	1	1
.. del dedo interior sin la uña.....	..	10
.. de su uña como la del dedo mediano.....	..	7
.. del dedo posterior.....	..	8
.. de su uña.....	..	10

La parte superior del cuerpo es de un pardo gris, que tira al aceituno; la frente hasta el vértice, una faja del ancho de 3 líneas sobre el ojo hasta la nuca, la barba, garganta, el pecho son de un castaño intenso, lo demas de la parte inferior del cuerpo de un pardo gris con algunas pintas en la punta de las plumas. Las plumas de la rejion ventral tienen delante de la punta, que es de un blanco sucio que tira al orin, un lunar redondo oscuro; algunas tienen tambien el borde exterior mas oscuro, de modo que hacen un dibujo bonito. Las plumas de los lados del cuerpo tienen primero una faja negra, despues una bermeja que tira a orin, despues otra vez una negra, i al fin un borde blanco en la punta. Las plumas anales i las cubiertas inferiores caudales, tienen casi el mismo dibujo; pero sus barbas son mas flojas como lana. Las alas i la cola son del color del dorso, pero tienen anchos bordes color de orin, de modo que estas partes parecen ser mas bermejas. Las cubiertas superiores de la cola i las plumas del obispillo son de un pardo que tira al orin; la cara inferior de la ala es de un pardo gris. Las plumas de la pierna son de un pardo bermejo; el pico i la parte desnuda de las piernas son negras. La cola se compone de catorce plumas como en el Pt. Tarnii. El pico es derecho, cónico, mui comprimido delante de los respiraderos. Las patas son medianamente robustas; las uñas poco encorvadas, anchas, mui redondas en la punta, pardas.

Descubrimos esta ave en diciembre de 1860 en la hacienda de la Puerta en la provincia de Colchagua, en una elevacion de como 5,000 pies sobre

el nivel del mar. Vivia en una quebrada angosta, en que corría un arroyo alimentado por los vecinos depósitos de nieve, i en la cual se habia desarrollado en consecuencia de la humedad i de la sombra una lozana vejetación, sobre todo de helechos. Su voz se parece mucho a la del *Tarnii*. Sus uñas gastadas indican que vive con mas frecuencia en los peñascos i en el suelo duro que en árboles i arbustos.

Nunca le hemos hallado en la provincia de Valdivia i parece ser en las provincias centrales el representante del *Pt. Tarnii*, tan comun en esa rejion. Se parece a éste muchísimo en su forma, tamaño i en el color sombrio, sin embargo se diferencia tanto en la reparticion de los matices que es imposible confundir ambas especies. El *Pt. Tarnii* tiene la parte superior de la cabeza de un bermejo vivo, el occipucio i todo el cuello hasta el pecho de un gris de pizarra i el dorso de un gris negruzco.

De las Alondras Chilenas.

Segun nuestras observaciones, que abrazan ahora un gran número de años, Chile posee tres especies de avecillas, que pertenecen a la gran familia de las Alondras, pero no al jénero *Alondra* como lo limitan los ornitólogos modernos.

El señor Desmurs describe en la parte ornitológica de la obra de Gay Zool. vol. 1 p. 286 i 287 dos especies de *Certhilauda* d'Orb. de las cuales podemos identificar una no mas, siendo que la descripcion de la otra, la *C. nigrofasciata* Lafresn., es mui insuficiente.

Certhilauda cunicularia. Lafr.

Geositta cunicularia Bonap. Consp. I. 215.—Caban. Mus. Hem II 22 85.—*Alauda cunicularia* Vieill. Enc. méth. Orn. 323.—*Geositta anthoides* Swains. two. Cent. 328. 129.—*Certhilauda cunicularia* Lafr. en d'Orb. Voy. Am. mér. IV. v. 3 p. 358. 288. t 43 f. 1.—*Alondra minera*. Azara Apunt. II. 13. n. 148.—*Certhilauda cunicularia* Gay hist. fis. etc. de Chile Zool. I. p. 286.—*Geositta cunicularia* Burm. Reise in die Laplata-Staaten II, 465. 91.

Nombre vulgar en Chile: *Caminero*, *Caminante*,

Carácter distintivo de la especie. El pecho es de un blanco sucio con rayitas longitudinales negras; barba exterior de la pluma exterior de la cola, blanca; barba interior de la misma de un rojizo que tira al orin.

	Pulg.	lín.
Longitud total.....	6	”
” del pico.....	”	8
” de la cola.....	1	9
Longitud de la ala desde su dobladura.....	3	3
” de la tibia.....	1	”
” del tarso.....	”	10
” del dedo mediano.....	”	8
” interior.....	”	5
” exterior.....	”	6
” posterior.....	”	6

