



## ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA

DE CHILE

POR

K. REICHE

(Continuación)

Planta anual, finamente pubérula, a primera vista casi pelada. Tallo derecho, ramoso. Hojas delgadas, casi sésiles, triangular-aovadas, aserrado-almenadas, en las muestras conservadas hasta 4 cm. de largo sobre el mismo ancho en la base. *Verticilastos de 10-12 flores*. Brácteas caducas. Flores pedunculadas. Cáliz de 8 mm. de largo, algo dilatado en la fructificación, acampanado, tridentado, recorrido por diez nervios elevados. Corola azul, pelada, del doble largo del cáliz; sus detalles en la muestra seca no pueden averiguarse. Estambres i estilo salientes, pelados; las ramitas estériles del conectivo se reúnen en un órgano linear-elíptico, según Philippi con el residuo de una antera abortada. Nuecesitas amarillentas.—De *S. rhombifolia* difiere en que ésta tiene los verticilastos solamente 6-flores. De las semillas que Philippi había coleccionado i mandado a Berlín, se crió una planta que según Klotzsch l. c. de *S. rhombifolia* se distinguió por su tallo mas elevado y ríji-

do, por las corolas blancas y las nuecesitas mas pequeñas.

En la zona litoral de la provincia de Antofagasta, entre los grados 24½-25½.

*Observacion.* *S. Gilliesii* Benth. es de la República Argentina, *S. splendens* Sell. se cultiva en los jardines.

f) *Estaquidoideas-Hormíneas.*

8. *Sphacele* (\*).—Benth.

Cáliz acampanado, irregularmente recorrido por diez nervios reticulados, abultado en la fructificación; su limbo abierto en 5 divisiones agudas. Corola con el tubo ancho, provisto de un anillo de pelos en el interior; el limbo corto, indistintamente bilabiado; el labio posterior escotado, el anterior trilobulado con la división del medio escotada. Estambres 4, ± didínamos, con las bolsitas de las anteras diverjentes. Disco en forma de anillo. Estilo con el ápice bifido. Nuecesitas lampiñas.—Arbustos con las hojas jeneralmente arrugadas por encima i blancotomentosas por debajo. Verticilastros 2-6-∞ flores. Corolas a veces vistosas, purpúreas, azules o blanquecinas.—Ca. 20 especies, desde California a Chile, en Colombia, en el Brasil, etc., en Chile 3 especies.

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| I Verticilos 4-6-flores. Corolas purpúreas.....    | 1. <i>Lindleyi</i>    |
| II Verticilos biflores. Corolas azules...          |                       |
| A. Láminas largamente atenuadas en el pecíolo..... | 2. <i>campanulata</i> |
| B. Láminas con la base acorazonado-aflechada.....  | 3. <i>subhastata</i>  |

I. S. LINDLEYI Benth. in Bot. Reg. sub t. 1289; Bot. Mag. t. 2993.—Gay IV páj. 506; (*Stachys Salviae* Lindl.; *Gardoquia salviifolia* Colla). "Salvia blanca".

(\*) Este nombre jenérico se conservará a pesar de la prioridad de *Alue-laguen* Adans. i de *Phytoxys* Mol. (Règles intern. de la nomencl. bot. adoptées par le congrès de Vienne, 1905; pj. 89).

































































































































